

**И Н С Т Р У К Ц И Я**  
для медицинского применения препарата  
**ФЛУОМИЗИН®**

**Регистрационный номер:** ЛСР-008618/09 от 28.10.2009 г.

**Торговое название препарата:** Флуомизин®

**Международное непатентованное название:** деквалиния хлорид

**Лекарственная форма:** таблетки вагинальные

**Состав на 1 таблетку:**

Активное вещество: деквалиния хлорид 10 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

**Описание**

Таблетки белого цвета, овальные, двояковыпуклые

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое средство.

**Код АТХ:** G01AC05

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика.*

Флуомизин® содержит активное вещество деквалиния хлорид, которое является четвертичным аммониевым соединением с широким спектром антимикробной активности. Деквалиния хлорид активен в отношении большинства грамположительных бактерий *Streptococcus* spp., включая (бета-гемолитические стрептококки группы А и В), *Staphylococcus aureus*, *Listeria* spp.; анаэробов *Peptostreptococcus* (группы D), грибов рода *Candida* (*Candida tropicalis*, *Candida albicans*, *Candida glabrata*), грамотрицательных бактерий *Gardnerella vaginalis*, *Escherichia coli*, *Serratia* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., и простейших (*Trichomonas vaginalis*).

*Фармакокинетика.* При интравагинальном введении крайне незначительное количество деквалиния хлорида всасывается через слизистую оболочку влагалища в системный кровоток, метаболизируется до производного 2,2 -дикарбоновой кислоты и выводится в неконъюгированной форме через кишечник.

### **Показания к применению**

- бактериальный вагиноз
- кандидозный вагинит
- трихомонадный вагинит
- санация влагалища перед гинекологическими операциями и родами.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Язвенные поражения эпителия влагалища и шейки матки.

Не рекомендуется применение деквалиния хлорида до начала половой жизни.

### **Применение при беременности и в период лактации**

Препарат разрешен к применению весь период беременности и лактации.

### **Способ применения и дозы**

Рекомендуемый режим дозирования – 1 вагинальная таблетка в сутки. Вагинальную таблетку вводят глубоко во влагалище вечером перед сном, лежа на спине, слегка согнув ноги.

Во время менструации лечение следует прекратить и продолжить прежний курс после ее окончания.

Необходимо провести полный курс лечения (6 дней) во избежание рецидива.

### **Побочные эффекты**

Крайне редко могут наблюдаться местные реакции раздражения (эрозии), зуд, жжение или покраснение в месте введения препарата. Однако эти нежелательные реакции также могут быть связаны с симптомами вагинальной инфекции.

Крайне редко лихорадка, аллергические реакции.

### **Передозировка**

Данные о передозировке отсутствуют. При интравагинальном применении передозировка маловероятна.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Флуомизин® несовместим с мылом и другими анионными поверхностно-активными веществами.

### **Особые указания**

Флуомизин® содержит вспомогательные вещества, которые иногда не полностью растворяются во влагалище. Поэтому остатки вагинальной таблетки можно обнаружить на нижнем белье. На эффективность Флуомизина® это не влияет.

В редких случаях, при чрезмерной сухости влагалища, есть вероятность, что таблетка останется нерастворенной. Для предотвращения этого, перед тем, как вводить вагинальную таблетку, ее необходимо смочить водой (в течение 1 секунды под струей воды).

В период лечения рекомендуется чаще менять прокладки и нижнее белье. Если клинические признаки инфекции сохраняются после завершения лечения, следует провести повторное микробиологическое исследование для выявления возбудителя и подтверждения диагноза.

В период лечения препаратом рекомендуется воздерживаться от половых контактов. Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров.

### **Влияние на способность управлять механизмами**

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и т.п.)

### **Форма выпуска**

Таблетки вагинальные 10 мг.

По 6 таблеток в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиевой и ПВХ.

По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

В недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Название и адрес производителя:**

**Мединова Лтд., Швейцария/ Medinova Ltd., Switzerland** Eggbüchlstrasse 14, CH-8052  
Цюрих, Швейцария /Eggbuehlstrasse 14, CH-8052 Zurich, Switzerland  
для **ООО «Инвар», Россия**

**Организация, принимающая претензии от потребителей**

ООО «Инвар», Россия, 410056, Саратов, ул. Рахова, д.61/71

Тел. (8452) 52-12-72; 52-13-08.

Представительство в Москве: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1

Тел: (495) 544-51-54; 964-15-75.